

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

БАКТАВИТ

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: БАКТАВИТ

Международное непатентованное название: пиклоксидин

Лекарственная форма: капли глазные

Состав на 1 мл препарата:

активное вещество: пиклоксидина дигидрохлорид 0,500 мг в пересчете на пиклоксидин* 0,434 мг;

вспомогательные вещества: полисорбат 80 0,250 мг, глюкоза безводная 50,000 мг, очищенная вода до 1 мл.

*Допускается 5 % избыток пиклоксидина дигидрохлорида при производстве препарата.

Описание: Прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство

Код АТХ: S01AX16

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Пиклоксидин - производное бигуанидов, противомикробное средство, оказывает антисептическое действие. Активен в отношении *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Eberthella typhosa*, *Klebsiella pneumo-*

niae, Proteus vulgaris, Shigella dysenteria, Bacillus subtilis, Chlamidia trachomatis; некоторых вирусов и грибов.

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция пиклоксидина низкая.

Показания к применению

Взрослые и дети от 0 лет:

- Бактериальные инфекции переднего отдела глаза
- Дакриоцистит
- Профилактика инфекционных осложнений в послеоперационном периоде после хирургических вмешательств в области переднего отдела глаза

Противопоказания

Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Так как отсутствуют сведения, подтверждающие эффективность и безопасность применения препарата в период беременности и грудного вскармливания, применение препарата возможно только в случае, когда польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Для лечения бактериальных инфекций закапывают по 1 капле препарата в конъюнктивальный мешок 2-6 раз в сутки. Продолжительность лечения составляет 10 дней. Целесообразность и необходимость продления срока лечения свыше 10 дней должна определяться врачом.

В послеоперационном периоде закапывают по 1 капле 3-4 раза в сутки.

Для профилактики послеоперационных осложнений (предоперационная подготовка) закапывают по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок непосредственно перед хирургическим вмешательством.

Побочное действие

В редких случаях возможно развитие аллергических реакций, проявляющихся конъюнктивальной инъекцией.

Передозировка

Данные о передозировке препаратом отсутствуют.

При попадании в глаза избыточного количества препарата следует промыть глаза стерильным физиологическим раствором.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

При необходимости закапывания нескольких лекарственных средств в конъюнктивальную полость препараты должны применяться по отдельности с интервалом не менее 15-ти минут.

Особые указания

Чтобы избежать заражения пипетки и раствора, следует быть осторожным и избегать соприкосновения с веками, прилегающими к глазу зонами или другими поверхностями.

Для предотвращения попадания препарата в системный кровоток через слизистую оболочку носа, рекомендуется надавить пальцами на внутренний угол глаза на 2 минуты после закапывания.

В случае использования нескольких местных офтальмологических препаратов, перерыв между закапываниями должен составлять не менее 15 минут. Нельзя использовать глазные капли БАКТАВИТ для субконъюнктивальных инъекций или для введения в переднюю камеру глаза. Глазные капли БАКТАВИТ не изменяют цвет контактных линз (включая мягкие гидрофильные), однако при инфекционных заболеваниях ношение контактных линз противопоказано.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

После закапывания возможно временное затуманивание зрения, которое может повлиять на способность управлять автомобилем или работать с техникой. Если после закапывания проявляются подобные симптомы, пациент должен подождать до восстановления четкости зрения перед тем, как управлять автомобилем или работать с техникой.

Форма выпуска

Капли глазные 0,5 мг/мл.

По 10 мл препарата помещают в прозрачный полимерный флакон-капельницу вместимостью 10 мл закрытый полимерной крышкой с предохранительным кольцом. По одному флакону-капельнице вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C, в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

После вскрытия флакона капли следует использовать в течение 4-х недель.

Препарат не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Предприятие-производитель/ организация, принимающая претензии

К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.

075100, ул. Ероилор № 1А, Отопень, уезд Ильфов, Румыния

Претензии по качеству препарата направлять по адресу:

Представитель производителя в РФ:

ООО «Ромфарма», Россия

121596, г. Москва, ул. Горбунова д. 2, стр. 204.

тел./факс: (495) 269-00-39.